

Cordulie à taches jaunes

Somatochlora flavomaculata

Vander Linden, 1825

NT

EN

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Répartition




Espèce présente en Europe occidentale, centrale et balkanique mais jamais de façon abondante.



Elle est généralement peu commune même si elle se rencontre dans de nombreux départements français (hors départements du nord-ouest et du sud méditerranéen).



Cette cordulie est rare en Limousin, plutôt bien répartie en Corrèze mais se limite aux Monts d'Ambazac et de Blonds en Haute-Vienne (répertoriée récemment en Creuse, secteur de la Courtine et de Mainsat).



Détermination



Yeux verts



Abdomen vert/noir brillant



Pièces anales ♂
longues quasi
parallèle



Taches jaunes sur
les côtés du thorax

Chapelet de petites taches jaunes latérales le long de l'abdomen.


Famille : Corduliidae
Genre : Somatochlora
Taille : 45-54 mm

Exuvie



Présence d'une pyramide anale (Anisoptères), masque en forme de cuillère, dents plutôt régulières, sillon à la base du masque (Corduliidae), épines dorsales et latérales sur segment 5 à 9 (segment 9 épines dorsale et latérale bien développées).





Cordulie à taches jaunes

Somatochlora flavomaculata

Vander Linden, 1825

Principes de conservation

La disparition des zones de développement des larves de Cordulie à taches jaunes par l'assèchement naturel (dynamique naturelle de la végétation), le drainage, l'artificialisation, ou le changement brutal de gestion, sont les principales menaces.

Habitats

S. flavomaculata se développe principalement dans des milieux riches en végétation comme les plans d'eau en cours d'atterrissement, les zones marécageuses et tourbières. On peut également la retrouver dans une eau légèrement courante et jusqu'à 1300m d'altitude.

Plan Régional d'Actions en faveur des Odonates - Limousin

A NOTER :

Cette libellule peut rester à l'état de larve 2 à 3 ans avant de se métamorphoser.

Les mâles patrouillent souvent au-dessus de zones plus sèches (chemins, lisières, clairières,...) et parfois au-dessus de l'eau.

Les taches jaunes deviennent quasi invisibles sur des individus matures.

Tourbière de Pioffret Blond, 87



Marais du Brezou Lagraulière, 19



Camp militaire de la Courtine La Courtine, 23



Plus d'informations :
www.conservatoirelimousin.com
<http://assoslo.free.fr/>
<http://odonates.pnaopie.fr/>

Avec le soutien financier de

