

Sympétrum noir

Sympetrum danae

Sulzer, 1776

NT

NT

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Répartition




Espèce holarctique dont la répartition s'étend du Japon à l'Amérique du Nord. Elle est présente dans la moitié nord de l'Europe.



S. danae est présent de manière inégale sur le territoire français. Les populations les plus abondantes sont localisées dans les massifs montagneux (Vosges, Alpes, Massif Central), l'ouest de la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais.



Le Sympétrum noir est principalement présent dans le Limousin au-dessus de 600m sur la Montagne limousine et dans les Monts d'Ambazac (rarement observé).



Détermination



Yeux verts et bruns



Ptérostigma noir



Pièces anales ♂
avec grand crochet sur l'hameçon



Large bande noire ponctuée de jaune sur le thorax



Lame vulvaire ♀
saillante de profil



Femelle

Abdomen noir et jaune/orangé (noir dominant ♂ / jaune dominant ♀)

Pattes noires

Famille : Libellulidae
Genre : Sympetrum
Taille : 29-34 mm

Exuvie



Présence d'une pyramide anale (Anisoptères), masque en forme de cuillère, dents plutôt régulières, pas de sillon à la base du masque (Libellulidae), côtés de l'occiput très convergents et yeux ronds (*Sympetrum*)

